

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE  
 ET DE LA FORÊT

 SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
 Ancienne Conserverie de CASAMOZZA  
 LUCCIANA - 20290 - BORGIO

Tél. 95.36.05.70



## EDITION CORSE

 Bulletin Technique N° 159  
 du 9 Novembre 1989

AGRUMES = La population de cératite diminue  
 SALADES = Attention au botrytis !  
 ARBRES FRUITIERS A NOYAU = Il est encore temps de  
 réaliser un deuxième traitement à base de cuivre

### AGRUMES

La cueillette des clémentines est commencée depuis quelques jours et la baisse de population de cératite continue à être nette dans les vergers. Il est devenu actuellement inutile de traiter.

### SALADES

Quelques conseils pour mener au mieux la culture .....

--> Vérifier l'état sanitaire du terreau de confection des mottes qui risque d'héberger des parasites.

--> L'implantation d'une nouvelle culture de laitues, scaroles doit être précédée d'une préparation soigneuse du terrain (nombreuses façons culturales qui détruisent énormément d'oeufs et de larves)

--> Matières actives utilisables contre le mildiou :  
 mancozèbe ( 16 g/are), manébe (16 g/are), zinébe (20 g/are) ou une association à base de mancozèbe : FULVAX, REMILTINE (20 g/are ) ou PULSAN (20 g/are).

--> Matières actives utilisables contre le botrytis et sclérotinia :  
 iprodione (7,5 g/are), procymidone (7,5 g/are) ou vinchlozoline (7,5 g/are). Ces deux dernières matières actives présentent des risques de phytotoxicité sur jeunes plants ou si elles sont associées à un insecticide.

P...77

--> Matières actives utilisables contre l'oïdium :  
 chinomethionate (0,75 g/are), soufre mouillable (40 à 62 g/are) en deux traitements  
 au stade 8 à 10 feuilles et au stade 18 feuilles

--> Matières actives utilisables contre le rhizoctonia solani :  
 BASITAC 75 PM (10 g/are) ou MONCEREN L (30 g/are).

### **\*\* Alternier les Matières Actives \*\***

:	:	:	:
:	Eliminer régulièrement les	:	Le dernier traitement
:	salades qui "coulent" .	:	doit se situer quand les
:	Les recueillir dans un sac	:	salades ont atteint le stade
:	de plastique afin de limiter	:	<b>15 à 17 feuilles</b> (compter toutes
:	la dissémination des germes	:	les feuilles à l'exception de
:	:	:	celles du coeur de moins de 3 cm <sup>2</sup> )
:	:	:	:

### **ARBRES A NOYAUX**

Vous pouvez encore réaliser le traitement à base de cuivre à la  
 chute des feuilles.

( C ) - SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX - 1989 - Toute reproduction même partielle  
 est soumise à notre autorisation.